



Influenza Aviar de Alta Patogenicidad:

Riesgo permanente para la avicultura y la biodiversidad en la región OIRSA



La **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP)**, causada principalmente por el virus influenza A subtipo H5N1, continúa representando una de las **enfermedades transfronterizas de mayor impacto** para la avicultura mundial, la biodiversidad y el comercio internacional.

Aunque, en Centroamérica, la situación epidemiológica es más favorable que durante la epidemia de 2022-2024, el virus permanece circulando activamente en aves silvestres migratorias, lo que mantiene un riesgo permanente en los países de la región OIRSA.

La **Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)** indica que la vigilancia, la bioseguridad y la detección temprana continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto sanitario y económico de la enfermedad.

Más de 208 millones de aves comerciales y de traspatio han muerto o han sido sacrificadas en Estados Unidos desde febrero de 2022, como consecuencia de la IAAP.



Situación mundial

De acuerdo con el Informe de Situación N.º 84 de la OMSA (junio de 2026), la IAAP continúa representando una importante amenaza para la sanidad animal mundial.

Resumen de la situación mundial de la IAAP

Ámbito	Indicador	Dato
Mundial (1 oct 2025 – 30 jun 2026)	Brotes en aves de corral	1,577 brotes en 44 países o territorios
Mundial (1 oct 2025 – 30 jun 2026)	Brotes en aves silvestres	7,301 brotes en 56 países o territorios (cifra más alta de las tres últimas temporadas)
América (junio 2026)	Brotes en aves de corral	Honduras y Estados Unidos
América (junio 2026)	Detecciones en aves silvestres	Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Estados Unidos
América (junio 2026)	Otras especies afectadas	Bovinos en Estados Unidos
Región OIRSA (2022 – 2026)	Países miembros con brotes notificados a la OMSA	México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá

Fuente: OMSA, Informe de Situación N.º 84 sobre influenza aviar de alta patogenicidad (junio de 2026); notificaciones de los países miembros del OIRSA a la OMSA, 2022–2026.

La OMSA recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, la bioseguridad y la aplicación del enfoque Una Sola Salud (One Health) para prevenir la propagación de la enfermedad.

Ante este escenario, el OIRSA recomienda mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, implementar estrictas medidas de bioseguridad y garantizar la notificación oportuna de los brotes, con el fin de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la salud pública.

IMPACTO PARA LA REGIÓN OIRSA

La región del OIRSA mantiene un **riesgo permanente de introducción y dispersión** de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), debido a factores ecológicos, productivos y comerciales que favorecen la circulación del virus. Entre los principales factores de riesgo destacan:

- La ubicación de la región dentro de importantes rutas migratorias de aves acuáticas del continente americano.
- La presencia de numerosos humedales y sitios Ramsar que constituyen áreas de descanso, alimentación y reproducción de aves migratorias.
- La amplia distribución de sistemas de producción avícola de traspatio, con niveles variables de bioseguridad.
- El comercio y la movilización regional de aves, productos avícolas y otros materiales de riesgo, que pueden favorecer la dispersión del virus cuando no se aplican adecuadamente las medidas sanitarias.

Entre **2022** y **2026**, cinco países miembros del OIRSA notificaron brotes de IAAP en aves de corral, domésticas y silvestres a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA): México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

¿POR QUÉ CONTINÚA SIENDO UNA AMENAZA?

La IAAP puede ocasionar:

Impacto sanitario

- Mortalidad superior al **90 %** en aves susceptibles.
- Rápida transmisión entre explotaciones avícolas.
- Amplia dispersión por aves silvestres migratorias.
- Infección de numerosas especies de aves silvestres y mamíferos, incluidos bovinos, felinos y mamíferos marinos.
- Riesgo de transmisión zoonótica esporádica en personas con exposición ocupacional a animales infectados.



Impacto económico

- Sacrificio sanitario de millones de aves.
- Restricciones al comercio nacional e internacional.
- Pérdidas económicas para productores y la industria avícola.
- Incremento en los precios de la carne de ave y los huevos.
- Costos asociados a vigilancia epidemiológica, control, bioseguridad e indemnización de productores.
- Afectación de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de los medios de vida de los pequeños productores.

Impacto ambiental

- Mortalidad masiva de aves silvestres y otros mamíferos terrestres y acuáticos.
- Afectación de especies amenazadas o protegidas.
- Alteración de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
- Riesgo de disminución de poblaciones reproductivas y de los servicios ecosistémicos.

¿CÓMO PUEDO IDENTIFICARLA?

Todo lo que debes saber de la INFLUENZA AVIAR

La influenza aviar es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a las aves domésticas, silvestres y a mamíferos. Aunque no es común, puede contagiar al humano.

¿Cómo se transmite la influenza aviar?



En aves, la influenza aviar se transmite por el contacto directo con heces o secreciones de aves infectadas y a través de objetos como ropa, zapatos, llantas o herramientas de trabajo contaminados por el virus.

¿Cómo cuidamos a nuestros animales de la influenza aviar?



Evita el contacto de las aves domésticas con aves silvestres y/o acuáticas.



Mantén limpio y desinfecta zonas en las que se crían las aves de corral o domésticas.



Control de entradas y movimientos de personal, nuevas aves, objetos y vehículos.



Signos de la enfermedad en aves:



Alta mortalidad



Descoordinación



Inflamación de las crestas, barbilla y patas que puede tornarse de color azul.



No olvides que si observas un **signo de enfermedad en aves silvestres** debes reportarlo de inmediato al Ministerio de Agricultura y Ganadería de tu país.



Aves bien cuidadas, influenza aviar no se propaga.



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA



www.oirsa.org



@OIRSAoficial



OIRSA

RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés de *Centers for Disease Control and Prevention*) señalan que:

- El riesgo para la población general continúa siendo **bajo**.
- La mayoría de los casos humanos se han asociado con la **exposición directa a aves infectadas o a mamíferos enfermos**.
- Hasta la fecha, **no existe evidencia de transmisión sostenida de persona a persona**.
- No obstante, los **trabajadores del sector avícola, médicos veterinarios, personal de laboratorio y otras personas que manipulan aves o mamíferos infectados o potencialmente infectados** deben utilizar equipo de protección personal y adoptar las medidas de bioseguridad recomendadas.

RECOMENDACIONES PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DEL OIRSA

Con el propósito de fortalecer la prevención, detección temprana y respuesta oportuna ante la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), se recomienda que los Servicios Veterinarios Oficiales continúen fortaleciendo las siguientes acciones:

- **Promover la notificación inmediata a los Servicios Veterinarios Oficiales por parte de la población en general**, ante sospechas o alta mortalidad en aves de corral, aves domésticas y aves silvestres.
- **Mantener una vigilancia reforzada** en aves de corral, aves domésticas y aves silvestres.
- **Desarrollar programas permanentes de capacitación** dirigidos a médicos veterinarios y personal de campo en base a los planes y procedimientos de vigilancia vigentes por país.
- **Sensibilizar a los productores sobre los riesgos de la IAAP**, identificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la notificación temprana.
- Mantener a las aves de corral y domésticas en **lugares protegidos, aisladas de otros animales**.
- Evitar el contacto de las aves de corral y domésticas con aves silvestres.
- **Limpiar y desinfectar las instalaciones, equipos y transporte de manera periódica**.
- **Proteger las fuentes de agua y alimento**.
- **Lavarse las manos con agua y jabón** luego de manipular a las aves.
- **Mantener y fortalecer las medidas de higiene y bioseguridad en las granjas avícolas**.



- **Fortalecer la coordinación entre los Servicios Veterinarios Oficiales**, las autoridades de salud pública, ambiente y vida silvestre para la detección temprana y la respuesta rápida ante eventos de IAAP.
- **Compartir oportunamente la información epidemiológica** entre las instituciones competentes y los países de la región.

Referencias

Centers for Disease Control and Prevention. (2026). *A(H5) Bird Flu: Current situation*. <https://www.cdc.gov/bird-flu/situation-summary/>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Emergencia y respuesta a la influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en América Central, América del Sur y el Caribe*. Santiago, Chile. <https://doi.org/10.4060/cd4707es>

World Organisation for Animal Health. (2021). *High pathogenicity avian influenza (HPAI)*. <https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/hpai.pdf>

World Organisation for Animal Health. (2025, December 18). *Statement on the impact of HPAI on wildlife worldwide*. <https://www.woah.org/en/statement-on-the-impact-of-hpai-on-wildlife-worldwide/>

World Organisation for Animal Health. (2026). *High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI): Situation Report 84 (Jun 2026)*. <https://www.woah.org/app/uploads/2026/07/hpai-situation-report-84.pdf>
U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. (2026). *Confirmations of highly pathogenic avian influenza in commercial and backyard flocks*. <https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/commercial-backyard-flocks>

OIRSA. (2025). *Influenza aviar, una amenaza para la Región OIRSA en primeros meses de 2025*. <https://web.oirsa.org/web-oirsa-org-boletines-uris>

**¡La prevención es responsabilidad de todas
y todos, protegemos nuestros países!**